



Unidad de
Diagnóstico
Integral de la
Mama



PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA BIOPSIA MAMARIA Y MARCACIÓN DE LESIÓN NO PALPABLE

(ESTEREOTÁXICA, MAMOGRAFÍA, ECOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA)

Preparación del paciente para biopsia mamaria mínimamente invasiva

- Dejar de tomar warfarina y aspirina 48 horas antes del examen.
- No comer 3 horas antes del examen.
- Acercarse a su cita acompañado por un familiar.
- Traer ropa cómoda (de preferencia con botones o cierre hacia adelante).
- Avisar a la tecnóloga en caso de ser alérgica a la Xilocaína.
- Recuerde que solo podrá tomar un baño 24 horas después de realizado el procedimiento.

Cuidados después de una biopsia mamaria mínimamente invasiva

- No usar sostén por al menos 24 horas después del procedimiento.
- Mantenga puesto el parche por 5 días y la venda por 24 horas.
- No tomar aspirina luego de 48 horas del procedimiento o consulte a su médico un producto alternativo o el reinicio de la Warfarina.
- Puede ducharse luego de 24 horas realizado el procedimiento, cuidando de no mojar el parche.
- No realice actividad física como trotar o gimnasio por 24 horas desde que se realizó el procedimiento.
- Pueden aparecer moretones o hematomas en el lugar o la parte inferior del seno, lo que puede ser habitual.
- Puede usar un pack de hielo para reducir los moretones.
- Debe acudir a controlarse el procedimiento a los 2 días del examen de 08:00 a 10:00am. al lugar donde le hicieron la biopsia.
- En caso de presentar dolor tomar Ibuprofeno de 500mg. (opcional), 1 tableta cada 8/horas en los alimentos.

Estereotáxica

Es un método por imágenes creado para realizar procedimientos mínimamente invasivos con la mama fija en una sola posición.

Contáctenos al

619-6161 Opción 1

y visite nuestra página web
www.clinicainternacional.com.pe